

ODČERVOVÁNÍ PSŮ

Začervení způsobují :

- **Ektoparaziti** – parazitují na tělním pokryvu či kožních strukturách zvířat (např. blechy, vši, klíšťata). Proti těmto parazitům doporučujeme použít vhodné preventivní obojky, spot-on preparáty či spraye.
- **Endoparaziti** – parazitují uvnitř organismu, mohou napadat všechny orgánové soustavy. Rozeznáváme dva typy endoparazitů, a to oblí červi (škrkavky) a ploší červi (tasemnice). Proti těmto parazitům doporučujeme aplikovat odčervovací kůru, podle tohoto zkráceného odčervovacího schématu:
 - **Štěňata a rostoucí psi:**

Odčervování je potřeba realizovat proti oblým červům ve 2., 4., 6. týdnu života štěňátka, a pak vždy po 2 měsících do roku štěněte, a to proti oblým i plochým červům.
 - **Dospělí psi:**

Je vhodné pravidelné odčervení 1x za 3 měsíce, a to proti oblým i plochým červům.
 - **Březí a kojící feny:**

Odčervení je potřebné provádět 42. den březosti a po porodu i se štěňaty, vždy proti oblým i plochým červům.

Odčervení je doporučováno provádět týden před vakcinací.

